







مکمل ویتامین A و تداوی ضد کرم (VAS + D) معیارهای واجد شرایط بودن

| گروه سنی | آخرین دوز گرفته شده | تشویش های صحی | دوز درست |
|----------------------------------|--|--|---|
| پایین تر از ۶ ماه | <p style="text-align: center;">طفل واجد شرایط نیست ، VAS + D ندهید.</p> | |  |
| ۶-۱۱ ماه | <p>را دریافت نکرده VAS در یک ماه گذشته</p> | <p>• امروز در تنفس مشکل جدی وجود ندارد</p> |  ← |
| ۱۲-۲۳ ماه (۱ سال الی ۲ سال) | VAS را در یک ماه گذشته دریافت نکرده | • امروز در تنفس مشکل جدی وجود ندارد |  ← |
| | در یک ماه گذشته تابلیت های ضد کرم دریافت نکرده | <p>• امروز در تنفس مشکل جدی وجود ندارد</p> <p>• امروز استفراغ نکرده</p> <p>• امروز تب ندارد</p> <p>• امروز اسهال نیست</p> |  ← |
| ۲۴ - ۵۹ ماه (۲ سال الی ۵ سال) | VAS را در یک ماه گذشته دریافت نکرده | • امروز در تنفس مشکل جدی وجود ندارد |  ← |
| | در یک ماه گذشته تابلیت های ضد کرم دریافت نکرده | <p>• امروز در تنفس مشکل جدی وجود ندارد</p> <p>• امروز استفراغ ندارد</p> <p>• امروز تب ندارد</p> <p>• امروز اسهال ندارد</p> |  ← |
| ۶۰ ماه یا بیشتر | <p style="text-align: center;">طفل واجد شرایط نیست ، VAS + D ندهید.</p> | |  |

• آن را به طفلی که گریه می کند ندهید. اول طفل را آرام کنید



• هرگز طفل را به زورمجبور به استفاده از VAS + D نکنید

• بینی طفل را نگه ندارید تا او را مجبور به بلعیدن کنید

• هنگام دادن VAS + D به طفل دست زننید


• ویتامین A یا تابلیت ضد کرم را با مراقبت کننده طفل به خانه نفرستید تا بعدا به طفل بدهد

برای جلوگیری از خفگی ، اطمینان حاصل کنید که طفل آرام است. به زور طفل را مجبور به استفاده از ویتامین A یا دوی ضد کرم نکنید.




قبل از ارائه خدمات به هر طفل، دستان خود را با استفاده از ضد عفونی کننده دست یا صابون و آب پاک تمیز کنید.


ویتامین A بدهید





روغن را از دست و مچگی پاک کنید



روغن را به دهن طفل فشار دهید




نوک کیسول ویتامین A را قطع کنید


| | |
|---|--|
| <p>۱۱ - ۶ ماه (۶ ماه الی ۱ سال)</p> <p>۱۰۰۰۰۰ واحد بین المللی (IU)</p> <p>۱ میلی (IU)</p>  | <p>۱۲ - ۵۹ ماه (۱ سال الی ۵ سال)</p> <p>۲۰۰۰۰ واحد بین المللی (IU)</p>  |
|---|--|

دوز را به اساس سن انتخاب کنید



دوی ضد کرم بدهید



از کاغذ قات شده استفاده کنید تا پودر را به آرامی در دهن طفل بریزید



تابلیت را میده یا ریزه کنید

| | |
|---|---|
| <p>۱۲ - ۲۳ ماه (۱ سال الی ۲ سال)</p> <p>۲۰۰ میلی گرام</p> <p>میده شده</p>  | <p>۲۴ - ۵۹ ماه (۲ سال الی ۵ سال)</p> <p>۴۰۰ میلی گرام</p> <p>میده شده</p>  |
|---|---|

دوز را به اساس سن انتخاب کنید