

GUIDE POUR DONNER DE LA VITAMINE A ET DEPARASITAGE ENSEMBLE



Education communautaire

- 1 Accueil des enfants et des accompagnants
- 2 Vitamine A et du déparasitage offerts aujourd'hui
- 3 Expliquer le rapport entre l'âge et la dose

Déparasitage
Vitamine A

6 à 11 mois (6 mois à 1 an)

12 à 23 mois (1 à 2 ans)

24 à 59 mois (2 à 5 ans)

- 4 Donner tous les 4 à 6 mois
- 5 Avantages de la vitamine A et du déparasitage en même temps :

Fort

Yeux en bonne santé

Sans vers pour un meilleur état nutritionnel

- 6 Effets secondaires qui pourraient se produire :

Nausée

Vomissements

Maux de tête

Perte d'appétit

Gonflement de la fontanelle (espace mou sur la tête)

Légères douleurs abdominales

Diarrhée

Fatigue

- 7 Les effets secondaires sont rares : affectent seulement chez 5 sur 100 enfants
- 8 Les effets secondaires peuvent durer un maximum de 2 jours
- 9 Si les symptômes durent plus de 2 jours, ou si d'autres symptômes apparaissent l'enfant est peut-être malade et doit recevoir une aide médicale.
- 10 Autres effets du déparasitage : Les vers peuvent se trouver dans les selles, ou dans les cas très rares sortir de la bouche ou du nez - Ceux-ci peuvent être tirés ou crachés.
- 11 Sans danger ; même quand donnés au même moment avec les vaccins
- 12 Demander s'il y a des questions

Nom: _____

Critères d'éligibilité



- 13 Demander le nom de l'enfant et sa carte de santé – pour vérifier le nom, son âge et la dernière dose.
- 14 Vérifier si l'enfant est éligible. L'enfant n'est pas admissible à un service s'il ne répond pas à tous les critères énumérés ci-dessous pour ce service.

Ne donnez jamais la vitamine A ou le vermifuge à l'accompagnant afin de le donner à l'enfant plus tard à la maison.

ELIGIBLE POUR LA VITAMINE A

COCHEZ OUI AUX 3 CRITÈRES SUIVANTS

6 à 59 mois
(6 mois à 5 ans)

- Demandez : Quel l'âge de votre enfant ?
- Vérifiez : L'âge est 6 à 59 mois

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

- Montrez les capsules de vitamine A à l'accompagnant
- Demandez : Quand est-ce que l'enfant a reçu sa dernière dose de vitamine A ?
- Vérifiez : Pas de vitamine A depuis 1 mois, l'enfant est dans les normes du calendrier de dosage de 4-6 mois

Demandez à l'accompagnant si l'enfant présente les symptômes suivants aujourd'hui. Pour la vitamine A – OBSERVER et s'assurer que l'enfant ne présente pas :



Sévère difficulté respiratoire aujourd'hui

Dans ce cas, ne pas offrir de services et référer l'enfant aux soins médicaux.

ELIGIBLE POUR LE DÉPARASITAGE

COCHEZ OUI AUX 3 CRITÈRES SUIVANTS

12 à 59 mois
(1 à 5 ans)

- Demandez : Quel l'âge de votre enfant ?
- Vérifiez : L'âge est 12 à 59 mois

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

- Montrez les comprimés de déparasitage à la personne qui accompagne l'enfant
- Demandez : Quand est-ce que l'enfant avait-il reçu un comprimé de déparasitage ?
- Vérifiez : Pas de déparasitage le mois passé

Demandez à l'accompagnant si l'enfant présente les symptômes suivants aujourd'hui. Pour la déparasitage – OBSERVER et s'assurer que l'enfant ne présente pas :



Sévère difficulté respiratoire aujourd'hui



Vomissements aujourd'hui



Fièvre aujourd'hui




Sévère diarrhée aujourd'hui


Dans ce cas, ne pas offrir de services et référer l'enfant aux soins médicaux.

Administration de la vitamine A

15 Se laver les mains




16 Demandez si l'enfant est confortable et assurez-vous que l'enfant est calme pour éviter l'étouffement.



Ne jamais forcer un enfant à prendre la vitamine A, ne tenez pas le nez de l'enfant pour le forcer à avaler, et ne la donnez pas à un enfant qui pleure.


17 Sélectionner la dose selon l'âge




18 L'accompagnant tient la tête de l'enfant et veille à ce qu'il ouvre la bouche



19 Couper la pointe de la capsule



20 Ne pas toucher l'enfant ; administrer la vitamine A




21 Jeter la capsule dans le récipient à déchets



22 Demander si l'enfant a avalé et qu'il va bien



23 Nettoyer l'huile des mains et des ciseaux




Ne jamais donner la vitamine A ou le vermifuge à l'accompagnant afin de le donner à l'enfant plus tard à la maison.

Administrier le vermifuge

- 24 Sélectionner la dose selon l'âge. Si vous utilisez un demi-comprimé, conservez l'autre moitié pour donner à un autre enfant

- 25 Ecraser le comprimé en une poudre fine avec une bouteille de verre. **TOUJOURS écraser les comprimés de vermifuge pour TOUS les enfants de moins de 5 ans.**



- 26 Demandez si l'enfant est confortable et assurez-vous que l'enfant est calme pour éviter l'étouffement.

- 27 L'accompagnant tient la tête de l'enfant et veille à ce qu'il ouvre la bouche. Ne pas toucher l'enfant, utiliser le papier plié pour verser la poudre dans la bouche de l'enfant.





Ne jamais forcer un enfant à prendre la un vermifuge, ne tenez pas le nez de l'enfant pour le forcer à avaler, et ne le donnez pas à un enfant qui pleure.



- 28 Jeter le papier dans le récipient à déchets.

- 29 Demander si l'enfant a mâché et s'il va bien.



Ne jamais donner la vitamine A ou le vermifuge à l'accompagnant afin de le donner à l'enfant plus tard à la maison.

FACULTATIF : Après avoir administrer le vermifuge a un enfant, vous pouvez lui donner de l'eau, spécialement si l'enfant se ble avoir les difficultés d'avalier. Donner l'eau après chaque vermifuge n'est pas nécessaire. Toujours utiliser l'eau potable et une tasse propre. S'assurer que l'enfant est assis est assis verticalement et ne bascule pas la tête vers l'arrière.



Si un enfant a du mal à avaler, vous pouvez donner à l'enfant une tasse d'eau potable.



Ne jamais forcer un enfant à boire de l'eau ou verser de l'eau dans la bouche d'un enfant.

Autres méthodes pour écraser les comprimés




Ecraser avec des cueillères

ou



Ecraser avec un mortier et pilon

Si du Mebendazole est administré, substituer cette étape à l'étape 24 ci-dessus




Même dose pour TOUS les enfants de moins de 5 ans

Tenue des dossiers et counseling à la sortie

30 Noter les doses administrées dans le registre et la carte de santé

31 Noter la date de retour de l'enfant

32 - 39 Counseling a la sortie



Pour les étapes 32 à 39, veuillez retourner à la page 1 et revoir les étapes 5 à 12 de la section Éducation communautaire avec la personne qui accompagne l'enfant.


Fournitures pour la distribution de SVA+D :

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Listes visuelles SVA+D | <input type="checkbox"/> Ciseaux propres | <input type="checkbox"/> Sac en plastique pour les déchets |
| <input type="checkbox"/> Vitamine A bleue 100,000 IU | <input type="checkbox"/> Serviettes | <input type="checkbox"/> Stylos à bille |
| <input type="checkbox"/> Vitamine A rouge 200,000 IU | <input type="checkbox"/> Petit morceau de papier blanc, propre | <input type="checkbox"/> Feuille de pointage |
| <input type="checkbox"/> Comprimés de vermifuge | <input type="checkbox"/> Bouteille en verre pour écraser le comprimé | <input type="checkbox"/> Registre de distribution |
| <input type="checkbox"/> Désinfectant pour les mains à base d'alcool | | |

QUOI FAIRE QUAND UN ENFANT S'ÉTOUFFE ?

Le personnel qui administre des comprimés aux petits enfants doit être formé de manière à pouvoir faire les gestes nécessaires si un enfant s'étouffe. Il devrait également bénéficier de l'autorité et de la confiance du personnel du poste à agir si nécessaire.



Pour les très jeunes enfants



- Allongez l'enfant sur votre genou, la tête vers le bas.
- Avec la paume de la main, donnez 5 tapes sur la partie médiane du dos de l'enfant.

- Si le problème n'est pas résolu :**
- Placez l'enfant le dos sur vos cuisses (il est sur le dos).
 - Exercez 5 pressions sur la cage thoracique en utilisant 2 doigts.
 - Répétez la manoeuvre si nécessaire.

Pour les enfants plus âgés



- Installez l'enfant sur le ventre sur vos cuisses, puis penchez sa tête vers le bas.
- Avec la paume de la main, donnez 5 tapes sur la partie médiane du dos de l'enfant.

- Si le problème n'est pas résolu :**
- Tenez-vous derrière l'enfant, en position debout. Placez vos mains sous les bras de l'enfant juste au-dessous de la cage thoracique.
 - Presse le corps de l'enfant vers le haut.
 - Répétez la manoeuvre si nécessaire.

