

PEDOMAN PEMBERIAN VITAMIN A DAN TABLET OBAT CACING UNTUK BALITA



Penyuluhan tentang VAS+D


- 1 Sambutan selamat datang kepada anak-anak dan pengasuh
- 2 Vitamin A dan obat cacing akan diberikan hari ini
- 3 Jelaskan hubungan antara umur anak dan dosis yang akan diterima




- 4 Berikan setiap 6 bulan sekali
- 5 Manfaat pemberian vitamin A dan obat cacing secara bersamaan:



- 6 Efek samping yang mungkin terjadi:



- 7 Efek samping jarang terjadi: hanya 5 dari 100 anak
- 8 Efek samping maksimal berlangsung selama 2 hari
- 9 Jika gejala efek samping ini berlangsung lebih dari 2 hari atau timbul gejala lainnya, itu bukan efek samping dari vitamin A atau obat cacing. Anak mungkin sakit dan harus dibawa ke fasilitas kesehatan.
- 10 Efek samping lainnya dari obat cacing: Cacing mungkin akan keluar dan berada di tinja/kotoran anak. Dalam kasus yang sangat jarang, cacing akan keluar melalui hidung atau mulut; cacing tersebut harus ditarik perlahan atau dimuntahkan.
- 11 Sangat aman, bahkan bila diberikan bersama vaksinasi
- 12 Tanyakan apakah ada pertanyaan



Nama: _____

Persyaratan Mendapatkan VAS+D




- 13 Tanyakan nama anak dan kartu sehat anak (KMS, Buku KIA) – untuk memeriksa nama, usia, dan kapan terakhir kali anak mendapatkan layanan.
- 14 Periksa apakah anak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan. Anak dianggap tidak memenuhi syarat jika tidak memenuhi semua persyaratan di bawah ini.


Kapsul vitamin A dan tablet obat cacing tidak boleh dititipkan kepada pengasuh untuk diberikan kepada anak nanti di rumah.

SYARAT UNTUK MENDAPATKAN VITAMIN A

BERI TANDA CENTANG PADA PILIHAN YA UNTUK 3 KRITERIA BERIKUT:



- ☒ Tanyakan: Berapa umur anak Anda?
- ☒ Periksa: Berumur 6-59 bulan



- ☒ Tunjukkan kapsul vitamin A kepada pengasuh
- ☒ Tanyakan: Kapan terakhir kali anak Anda mendapatkan kapsul vitamin A?
- ☒ Periksa: Anak tidak mendapatkan kapsul vitamin A dalam 1 bulan terakhir, anak berada dalam jadwal pemberian dosis 4-6 bulan

Tanyakan pengasuh apakah anak mengalami gejala di bawah ini pada hari ini.
Untuk memberikan vitamin A – AMATI dan pastikan TIDAK ADA:




- ☒ Sesak napas yang parah pada hari ini


Jika ada, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan

SYARAT UNTUK MENDAPATKAN TABLET OBAT CACING

BERI TANDA CENTANG PADA PILIHAN YA UNTUK 3 KRITERIA BERIKUT:



- ☒ Tanyakan: Berapa umur anak Anda?
- ☒ Periksa: Umur 12-59 bulan



- ☒ Tunjukkan tablet obat cacing kepada pengasuh
- ☒ Tanyakan: Kapan terakhir kali anak Anda mendapatkan tablet obat cacing?
- ☒ Periksa: Tidak mendapatkan tablet obat cacing dalam 1 bulan terakhir

Tanyakan pengasuh apakah anak mengalami gejala di bawah ini pada hari ini.
Untuk memberikan tablet obat cacing – AMATI dan pastikan TIDAK ADA:



- ☒ Sesak napas yang parah pada hari ini



- ☒ Muntah pada hari ini



- ☒ Demam pada hari ini




- ☒ Diare berat pada hari ini


Jika ada, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan

Pemberian Kapsul Vitamin A

15 Bersihkan tangan Anda




16 Pastikan anak tenang, supaya tidak tersedak




Jangan pernah memaksa anak menerima kapsul vitamin A dan jangan berikan apabila anak masih menangis untuk menghindari risiko tersedak.


17 Pilih dosis sesuai umur anak.




18 Pengasuh membantu memegang bagian belakang kepala anak dan membuka mulut anak.



19 Gunting ujung kapsul vitamin A



20 Tanpa menyentuh anak; berikan vitamin A dengan cara memencet kapsul




21 Buang bekas kapsul ke tempat sampah



22 Tanyakan apakah anak telah menelan semua minyaknya, dan merasa nyaman.



23 Hapus sisa kelebihan minyak pada tangan dan gunting.



Kapsul vitamin A dan tablet obat cacing tidak boleh dititipkan kepada pengasuh untuk diberikan kepada anak nanti di rumah.

Pemberian Tablet Obat Cacing

- 24 Pilih dosis sesuai umur anak. Jika menggunakan setengah tablet, simpan sisa tablet untuk digunakan kepada anak yang lain

- 25 Hancurkan tablet menjadi bubuk halus dengan alat penumbuk yang tersedia (misalnya: botol kaca). **Pastikan tablet obat cacing selalu dihancurkan sebelum diberikan kepada SEMUA anak berumur di bawah 5 tahun.**

Umur 12-23 bulan
(1 tahun sampai 2 tahun kurang)


HANCURKAN

200 mg

Umur 24-59 bulan
(2 tahun sampai 5 tahun kurang)


HANCURKAN

400 mg



- 26 Pastikan anak tenang, supaya tidak tersedak

- 27 Pengasuh membantu memegang bagian belakang kepala anak dan membuka mulut anak. Tanpa menyentuh anak, gunakan lipatan kertas untuk memasukkan bubuk halus ke dalam mulut anak.




Jangan pernah memaksa anak menerima tablet obat cacing dan jangan berikan apabila anak masih menangis.




- 28 Buang kertas yang sudah dipakai ke tempat sampah

- 29 Tanyakan apakah anak telah mengunyah dan menelan seluruh tablet, serta merasa nyaman



Kapsul vitamin A dan tablet obat cacing tidak boleh dititipkan kepada pengasuh untuk diberikan kepada anak nanti di rumah.

PILIHAN: Setelah menelan tablet obat cacing, anak boleh diberi air minum, khususnya jika anak tampak sulit menelan. Memberikan air minum setelah menelan tablet obat cacing tidak selalu diperlukan. Selalu berikan air minum yang bersih dengan menggunakan gelas bersih. Pastikan anak duduk tegak dan tidak mencondongkan kepalanya ke belakang.



Jika anak sulit menelan, Anda dapat memberikan air minum yang bersih dalam gelas yang bersih.



Jangan memaksa anak meminum air dan jangan menuangkan air ke dalam mulut anak.

Cara Lain untuk Menghancurkan Tablet



atau



Hancurkan tablet dengan sendok sampai halus

Hancurkan tablet dengan mortar dan alu sampai halus.

Jika memberikan Mebendazole, ganti tahapan 24 di atas dengan tahapan ini

Umur 12-59 bulan

HANCURKAN

500mg


Dosis yang sama untuk SEMUA anak di bawah 5 tahun

Pencatatan dan Pemberian Konseling

- 30** Catat dosis yang telah diberikan pada buku pendaftaran dan kartu sehat anak (KMS, Buku KIA)



- 31** Catat tanggal kembali pada kartu sehat dan beritahu pengasuh kapan dia harus kembali untuk mendapatkan layanan berikutnya



- 32 - 39** Pemberian konseling

Untuk Tahapan 32-39, silakan kembali ke halaman 1 dan lihat kembali tahapan 5-12 pada bagian Penyuluhan tentang VAS+D bersama pengasuh.



Barang dan persediaan untuk pemberian layanan VAS+D:

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Pedoman bergambar VAS+D | ☐ Gunting bersih | ☐ Kantong plastik untuk sampah |
| ☐ Kapsul biru Vitamin A 100.000 SI | ☐ Serbet/Tisu bersih | ☐ Alat tulis |
| ☐ Kapsul merah Vitamin A 200.000 SI | ☐ Kertas putih kecil dan bersih | ☐ Lembar Perhitungan Harian |
| ☐ Tablet obat cacing | ☐ Botol kaca untuk menghaluskan tablet | ☐ Buku Pendaftaran Pemberian VAS+D |
| ☐ Cairan pembersih tangan beralkohol | | |

APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA ANAK TERSEDAK

Penyedia layanan yang memberikan tablet kepada anak kecil harus dilatih bagaimana menangani anak yang terседak. Mereka juga harus mendapat kewenangan dan kepercayaan dari tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan untuk melakukan tindakan selanjutnya jika diperlukan.



Untuk anak yang masih sangat kecil



- Tengkurapkan anak di paha Anda, kemudian arahkan kepala anak ke bawah.
- Tepuk-tepuk punggung anak sebanyak 5 kali dengan telapak tangan.

- Jika belum berhasil:
- Telentangkan anak di atas paha Anda.
 - Tekan pada daerah dada anak selama 5 kali menggunakan 2 jari tangan.
 - Ulangi jika perlu.

Untuk anak yang lebih besar



- Tengkurapkan anak di paha Anda, kemudian arahkan kepala anak ke bawah.
- Tepuk-tepuk punggung anak sebanyak 5 kali dengan telapak tangan.

- Jika belum berhasil:
- Berdirilah di belakang anak dan lingkarkan kedua lengan Anda di bawah lengan anak tepat di bawah tulang rusuknya.
 - Apit dan lakukan gerakan hentakan ke atas dengan cepat.
 - Ulangi jika perlu.

