

Ajuda no trabalho

Checklist Visual para Dar vitamina a e desparasitação juntos

Instruções: Este visual checklist é uma versão de imagem da desempenho checklist para Vitamina A Suplementação de Desparasitação (VAS + D). Cada um dos 39 passos no desempenho lista de verificação aparecem aqui em forma de imagem. A finalidade desta lista de verificação visual é ajudar você ao entregar VAS + D e quando estiver treinando outras pessoas para fornecer VAS + D, conforme aprovado pela sua organização. À medida que você pratica e se torna habilidoso em fornecer VAS + D, você deve usar uma caneta esferográfica e fazer anotações neste visual lista de verificação para lembrá-lo de pontos importantes. Aqui estão as etapas gerais para usar a lista de verificação visual ao treinar outras pessoas para fornecer VAS + D:

1. Explicação: Use este visual lista de verificação para explicar cada uma das etapas na entrega do serviço VAS + D (usando a performance lista de verificação para fornecer informações mais detalhadas).

- Primeiro, mostre e explique as três partes da lista de verificação.
- Então, enquanto todos apontam para o passo 1, pergunte “O que você vê na foto?”.
- Em seguida, uma pessoa que leia as palavras do passo 1 em voz alta. Faça turnos para todos os 39 passos.

2. Demonstrar: Executar todas as 39 etapas na entrega do serviço VAS + D usando esta lista de verificação visual.

3. Técnico: Pergunte aos prestadores de serviços para usar suas cópias da visual lista de verificação para praticar dando VAS + D (geralmente em pares) enquanto observa e fornece feedback.

4. Feedback ou retorno: Dê a cada provedor de serviço a resposta sobre as etapas que estão fazendo bem e as etapas que precisam para praticar mais. Tenha uma ou mais cópias desta lista de verificação visual disponível quando os serviços VAS + D estiverem sendo fornecidos. Você e os outros provedores de serviços podem consultar a lista de verificação conforme necessário para ajudar a garantir que serviços corretos e seguros sejam fornecidos.

Para obter mais informações sobre a prestação de serviços VAS + D, incluindo uma cópia da lista de verificação desempenho, um vídeo sobre como fornecer VAS + D, e outros materiais, vá ao site da Vitamin Angels em www.vitaminangels.org.

Suprimentos para VAS + D distribuição:

- Verificação visual VAS + D
- 100.000 UI azul vitamina A
- 200.000 UI vermelho vitamina A
- Comprimidos de desinfecção
- Desinfetante para as mãos à base de álcool
- Limpe a tesoura
- Guardanapos / guardanapos
- Papel branco pequeno, limpo
- Frasco de vidro para esmagar o comprimido
- Saco de plástico para lixo
- Canetas esferográficas
- Folha de Tally
- Registo de Distribuição

O que fazer se uma criança se afogar

Pessoal que administra os comprimidos a crianças pequenas deve ser treinado sobre o que fazer se uma criança engasgar. Eles também devem ter a autoridade e o respeito do pessoal de posto de saúde para agir, se necessário.

Para crianças muito pequenas




- Coloque o tórax da criança na coxa e depois incline a cabeça da criança para baixo.
- Thump na parte do meio das costas da criança 5 vezes usando a palma da mão.




- Se o problema não for resolvido:**
- Coloque a criança na coxa virada para cima (criança nas costas).
 - Pressione na região torácica da criança 5 vezes usando seus 2 dedos.
 - Repita, se necessário.

Para crianças mais velhas



- Coloque a criança em seu abdômen na coxa e, em seguida, incline a cabeça da criança para baixo.
- Thump na parte do meio das costas da criança 5 vezes usando a palma da mão.






- Se o problema não for resolvido:**
- Segure a criança por trás em pé com as mãos abaixo dos braços da criança, logo abaixo da caixa torácica.
 - Pressione o corpo da criança para cima.
 - Repita, se necessário.



Parte 1

Educação na comunidade




1 Boas-vindas crianças e cuidadores

2 Vitamina a e desparasitação dada hoje

3 Explique idade a doz relacionamento

4 Dar a cada 4 a 6 meses




5 Benefícios da vitamina A e desparasitação juntos:



Forte



Olhos saudáveis



Sem vermes para uma melhor nutrição

6 Os efeitos secundários que podem ocorrer:




Náusea




Vômitos



Dor de cabeça




Perda de Apetite




Inchaço do Fontanela

(ponto fraco na cabeça)



Dor Abdominal Leve




Diarreia




Fadiga

7 Efeitos secundários raros: apenas 5 em cada 100 crianças



8 Os efeitos colaterais duram máximo de 2 dias



9 Para sintomas além de 2 dias, ou se outros sintomas se desenvolverem, procure ajuda médica




10 Outros efeitos de desparasitação: Os vermes podem estar nas fezes ou nas cascas muito raros, saia do nariz ou da boca - estes podem ser arrancados ou cuspidos

11 Muito seguro; mesmo com vacinas

12 Faça perguntas



Parte 2a Critérios de elegibilidade a qualificam



- 13** Peça o nome da criança e cartão de saúde - use para verificar o nome, idade e última dose

- 14** Verifique a elegibilidade. Child não é elegível para um serviço, a menos que atenda a todos os critérios listados abaixo desse serviço. **Nunca envie vitamina A ou desparasitação para casa com um cuidador para dar à criança mais tarde**

Qualifique-se para a vitamina A



6-59 meses
(6 meses até 5 anos)

- Pergunte: Qual é a idade do seu filho?
- Verificar: Idade é 6-59 meses

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

- Mostrar cápsulas de vitamina A ao cuidador
- Pergunte: Quando a criança recebeu a vitamina A pela última vez?
- Verificar: Sem vitamina A nos últimos 1 meses

Perguntar ao cuidador se a criança tiver alguma do seguinte hoje. Em caso afirmativo, não dê serviço e encaminhe a criança para ajuda médica.


Para vitamina A - OBSERVAR e verificar se NÃO há:



- Grave Dificuldade em Respirar Hoje

 = Etapas críticas para prestadores de serviços

Qualifique-se para desparasitação



12-59 Meses
(1 ano até 5 anos)

- Pergunte: Qual é a idade do seu filho?
- Verificar: Idade é de 12 a 59 meses

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31


- Mostrar comprimidos de desparasitação para o cuidador
- Pergunte: Quando a criança recebeu pela última vez desparasitação?
- Verificar: Não desparasitar nos últimos 1 meses

Perguntar ao cuidador se a criança tiver alguma do seguinte hoje. Em caso afirmativo, não dê serviço e encaminhe a criança para ajuda médica.


Para desparasitação - Observe e verifique se não há NO:



- Grave Dificuldade em Respirar Hoje
- Vômitos Hoje
- Febre Hoje
- Diarreia grave Hoje




15 Limpe suas mãos




16 Para evitar asfixia, pergunte e certifique-se de que a criança esteja calma. **Nunca force uma criança a tomar vitamina A, não segure o nariz de uma criança para forçá-la a engolir, e não dê para uma criança que está chorando.**

<p>6-11 meses (6 meses até 1 ano)</p> <p>100.000 UI</p>	<p>12-59 Meses (1 ano até 5 anos)</p> <p>200.000 IU</p>
---	---


17 Escolha a dose por idade



18 O cuidador segura a cabeça e ajuda a criança a abrir a boca



19 Cortar a ponta da cápsula




20 Não toque na criança; dar vitamina A



21 Descartar a cápsula no recipiente de resíduos




22 Pergunte se a criança engoliu óleo e está bem




23 Limpe o óleo das mãos e tesouras

<p>12-23 Meses (1 ano até 2 anos)</p> <p>ESMAGADO</p>  <p>200 mg</p> 	<p>24-59 Meses (2 anos até 5 anos)</p> <p>ESMAGADO</p>  <p>400 mg</p> 
--	---

24 Escolha a dose por idade. Se estiver usando meio comprimido, armazene a outra metade para outra criança.




25 Esmagar o comprimido em pó fino com uma garrafa de vidro. **SEMPRE** esmague os comprimidos de desparaticao para **TODAS** as crianças com menos de 5 anos.



26 Para evitar asfixia, pergunte e certifique-se de que a criança esteja calma. **Nunca** force uma criança a desparaticar, não segure o nariz de uma criança para forçá-la a engolir e não a dê a uma criança que esteja chorando.



27 O Cuidador segura a cabeça e ajuda a criança a abrir a boca. Não toque na criança, use papel dobrado para derramar lentamente o pó na boca da criança.



28 Descartar papel no recipiente de resíduos



29 Pergunte se a criança mastigado e é bom

OPCIONAL: Após administrar desparaticação a uma criança, você pode dar água para beber, especialmente se a criança parece ser dificuldade experimentando engolir. Dando água depois de cada vez desparaticação não é necessário. Use sempre água potável água num copo limpo. Certifique-se de que a criança está sentada de forma recta e não inclinar sua cabeça para trás.



a Se uma criança está experimentando dificuldade em engolir, você podem dar à criança um copo com água potável.



b Nunca force uma criança a beber água e não derrame água na boca de uma criança.

Métodos alternativos de britagem



Esmagar com colheres

ou



Esmagar com argamassa e pilão


Se administrar o Mebendazol substituir este passo do passo 24 anterior

<p>12 - 59 meses</p> <p>ESMAGADO</p>  <p>500 mg</p> 	
---	---


24 Mesma dose para **TODAS** as crianças menores de 5 anos



30 Registrar as doses dadas no registo e o cartão de saúde



31 Escreva a data de retorno para a criança e diga ao cuidador quando devolver



32 Muito seguro; mesmo com vacinas

33 Efeitos colaterais que pode ocorrer:



Náusea




Vômitos



Dor de cabeça




Perda de Appetite




Inchaço do Fontanela

(ponto fraco na cabeça)



Dor Abdominal Leve




Diarreia



Fadiga


37 Outros efeitos de desparasitação: Os vermes podem estar nas fezes ou nas casos muito raros, saia do nariz ou da boca - estes podem ser arrancados ou cuspidos




38 Benefícios da vitamina A e desparasitação juntos:



Forte




Olhos Saudáveis




Sem vermes para uma melhor nutrição

34 Efeitos secundários raros: apenas 5 em cada 100 crianças



35 Os efeitos colaterais duram máximo de 2 dias

36 Para sintomas além de 2 dias, ou se outros sintomas se desenvolverem, procure ajuda médica



39 Perguntas

