

GUÍA PARA ADMINISTRAR VITAMINA A Y DESPARASITANTE



Educación Comunitaria

- 1 Dé la bienvenida a los niños y cuidadores
- 2 Vitamina A y desparasitantes administrados el día de hoy
- 3 Explique la dosificación de acuerdo a la edad

Déparasitage
Vitamine A

Edad	Dosis
6 a 11 meses (6 meses a 1 año)	1 gota azul
12 a 23 meses (1 a 2 años)	1 gota roja
24 a 59 meses (2 a 5 años)	1 tableta

- 4 Dar cada 4 a 6 meses
- 5 Beneficios de la vitamina A y la desparasitación juntos:

Fortaleza

Ojos Sanos

Libre de lombrices para una mejor nutrición

- 6 Efectos secundarios que pueden ocurrir:

Nausea	Vómito	Dolores de cabeza	Pérdida de apetito	Inflamación de la fontanela (punto blando en la cabeza)	Dolor leve del abdomen	Diarrea	Fatiga

- 7 Efectos adversos raros: solamente 5 de cada 100 niños los presentan
- 8 Efectos secundarios son temporales y duran un máximo de 2 días
- 9 Si los síntomas duran más de 2 días o si aparecen otros, no se debe a los efectos secundarios de la vitamina A o desparasitación. El niño podría estar enfermo y deberá buscar atención médica.
- 10 Otros efectos de la desparasitación: Las lombrices pueden estar en el excremento o en casos muy raros salir por la boca y la nariz – éstas se pueden quitar jalándolos o escupiéndolos
- 11 Muy seguros; aún con vacunas
- 12 Pregunte si tiene dudas

Nombre: _____

Criterios de Elegibilidad




- 13 Pregunte el nombre del niño y pida el carnet de salud – utilícelos para verificar nombre, edad, y última dosis.
- 14 Verifique la elegibilidad. El niño no es elegible para recibir el servicio si no cumple con todos los criterios listados bajo ese servicio.

Nunca envíe vitamina A o desparasitantes a casa con el cuidador para dárselos al niño más tarde.


ELEGIBLE PARA VITAMINA A



MARQUE SI A LOS SIGUIENTES 3 CRITERIOS



- Pregunte: ¿Qué edad tiene su hijo?
- Revise: la edad es de 6 a 59 meses



- Muestre las cápsulas de vitamina A al cuidador
- Pregunte: ¿Cuándo recibió el niño su última dosis de vitamina A?
- Revise: No ha recibido vitamina A en el último mes, el niño está dentro del programa de dosificación de 4-6 meses

Pregunte al cuidador si el niño tiene el siguiente síntoma el día de hoy. Para vitamina A – OBSERVE y asegúrese que el día de hoy NO tiene:




Dificultad severa para respirar hoy

Si es así, el niño está enfermo. No brinde servicio y refiera al niño para recibir ayuda médica.


ELEGIBLE PARA EL DESPARASITANTE



MARQUE SI A LOS SIGUIENTES 3 CRITERIOS



- Pregunte: ¿Qué edad tiene su hijo?
- Revise: la edad es de 12 a 59 meses



- Muestre las tabletas de desparasitación al cuidador
- Pregunte: ¿Cuándo recibió el niño su última dosis de desparasitación?
- Revise: No ha recibido desparasitación en el último 1 mes

Pregunte al cuidador si el niño tiene los siguientes síntomas el día de hoy. Para desparasitación– OBSERVE y asegúrese que el día de hoy NO tiene:




Dificultad severa para respirar hoy



Vómitos hoy



Fiebre hoy




Diarrea severa hoy


Si es así, el niño está enfermo. No brinde servicio y refiera al niño para recibir ayuda médica.

Administrando Vitamina A

15 Lávese las manos




16 Para prevenir la asfixia, pregunte y asegúrese que el niño está calmado.



Nunca obligue a un niño a tomar la vitamina A. No le apriete la nariz al niño para forzarlo a que la trague y no se la dé a un niño que esté llorando.


17 Seleccione la dosis apropiada para la edad




18 El cuidador sostiene la cabeza y ayuda al niño a abrir la boca



19 Cortar la punta de la cápsula



20 No toque el niño; administre la vitamina A




21 Deseche la cápsula en un contenedor apropiado



22 Pregunte si el niño se tragó todo el aceite y si se encuentra bien.



23 Limpie el aceite de sus manos y de las tijeras




Nunca envíe vitamina A o desparasitantes a casa con el cuidador para dárselos al niño más tarde.

Administrando Desparasitante

24 Seleccione la dosis apropiada para la edad. Si usa media tableta, guarde la otra mitad para usarla con otro niño.


25 Triture la tableta en un polvo fino usando una botella de vidrio. **SIEMPRE** triture las tabletas de desparasitación para **TODOS** los niños menores de 5 años.

<p>12 a 23 meses (1 a 2 años)</p> <p>TRITURADA</p> <p>200 mg</p>	<p>24 a 59 meses (2 a 5 años)</p> <p>TRITURADA</p> <p>400 mg</p>
---	---



26 Para prevenir la asfixia, pregunte y asegúrese que el niño está calmado.

27 Cuidador sostiene la cabeza y ayuda al niño a abrir la boca. No toque al niño; use un papel doblado para verter lentamente el polvo en la boca del niño.





Nunca obligue a un niño a tomar el desparasitante. No le apriete la nariz al niño para forzarlo a que la trague y no se la dé a un niño que éste llorando.



28 Deseche el papel en un contenedor apropiado.

29 Pregunte si el niño se encuentra bien.



Nunca envíe vitamina A o desparasitantes a casa con el cuidador para dárselos al niño más tarde.

OPCIONAL: Si después de darle el desparasitante al niño usted observa que el niño tiene dificultad en tragárselo, dele agua. No es necesario darle agua a cada niño después de suministrarle el desparasitante. Siempre use agua potable en un vaso limpio. Asegúrese de que el niño este sentado derecho y no inclinado con la cabeza para atrás.



Si el niño tiene dificultad para tragar, dele agua potable en un vaso limpio.



Nunca obligue a un niño a tomar agua y no vierta el agua dentro de la boca del niño.

Alternativas para triturar la pastilla



Triturar usando cucharas



Triturar con mortero y maja

Si está administrando Mebendazol sustituya este paso por el paso 24 arriba

<p>12 a 59 Meses</p> <p>TRITURADA</p> <p>500mg</p>


Misma dosis para **TODOS** los niños menores de 5 años

Mantenimiento de Registros y Asesoría

- 30 Anote las dosis dadas en su registro de distribución y en el carnet de salud del niño



- 31 Apunte e informe al cuidador de la fecha en que deberá regresar el niño



- 32 - 39 Asesoría final

Para los pasos 32 a 39, vuelva a la página 1 y revise los pasos 5 a 12 de la sección “Educación Comunitaria” con el cuidador.


Materiales para la distribución de SVA+D:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Guía Visual de SVA+D | <input type="checkbox"/> Tijeras limpias | <input type="checkbox"/> Bolsa de plástico para la basura |
| <input type="checkbox"/> 100.000 UI vitamina A azul | <input type="checkbox"/> Servilletas/pañuelos desechables | <input type="checkbox"/> Bolígrafos |
| <input type="checkbox"/> 200.000 UI vitamina A roja | <input type="checkbox"/> Hoja de papel blanca, pequeña y limpia | <input type="checkbox"/> Listas de control |
| <input type="checkbox"/> Tabletas de desparasitación | <input type="checkbox"/> Botella de vidrio para triturar tableta | <input type="checkbox"/> Registro de distribución |
| <input type="checkbox"/> Desinfectante para manos a base de alcohol | | |

¿QUÉ HACER SI UN NIÑO SE ESTÁ ASFIXIANDO?

El personal que administra las tabletas a los niños pequeños deberá estar capacitado en qué hacer si un niño se asfixia. También deberán tener la autoridad y el respeto del personal en el puesto de salud para actuar en caso necesario.



Para los niños muy pequeños



- Coloque el pecho del niño sobre su muslo, y luego incline la cabeza del niño hacia abajo.
- Golpee la parte media de la espalda del niño 5 veces usando la palma de su mano.

- Si el problema no se resuelve:
- Coloque al niño en su muslo boca arriba (el niño de espaldas).
 - Presione en el área torácica del niño 5 veces usando sus 2 dedos.
 - Repita si es necesario.

Para los niños mayores



- Coloque el abdomen del niño en su muslo y luego incline la cabeza del niño hacia abajo.
- Golpee la parte media de la espalda del niño 5 veces usando la palma de su mano.

- Si el problema no se resuelve:
- Sostenga al niño por atrás mientras el niño está de pie y coloque sus manos debajo de los brazos del niño justo debajo de la caja torácica.
 - Presione el cuerpo del niño hacia arriba.
 - Repita si es necesario.

